



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期										
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上			
B型肝炎	ユニバーサル	不活化		①	②					③														(注1)		
	母子感染予防		①	②						③																
ロタウイルス	1価	生		①	②	(注2)																				
	5価			①	②	③	(注3)																			
肺炎球菌 (PCV15、PCV20)	不活化			①	②	③					④													(注4)		
5種混合 (DPT-IPV-Hib)	不活化			①	②	③					④						7.5歳まで							15歳未満まで使用可能		
3種混合 (DPT)	不活化																①							② 11-12歳 (注6)		
2種混合 (DT)	不活化																							① 11歳 12歳		
ポリオ (IPV)	不活化																①							(注7)		
インフルエンザ菌b型 (ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合	不活化			①	②	③					④													(注8)		
BCG	生									①																
麻疹・風疹混合 (MR)	生											① (注10)					② (注9,10)									
水痘	生										①		②											(注11)		
おたふくかぜ	生										①						② (注12)									
日本脳炎	不活化															① ② ③	7.5歳まで					④ 9-12歳				
不活化インフルエンザ	不活化																							13歳以上①		
経鼻弱毒生インフルエンザ	生																							2歳以上～19歳未満に 毎年 (10月、11月などに) ① 点鼻		
新型コロナ	mRNA 不活化																							製剤により使用できる年齢が異なる		
ヒトパピローマウイルス (HPV)	女性	9価	不活化																				(注13)	小6	中1①② (注14)	中2～高1相当 (注15)
		2価・4価	不活化																				(注13)	小6	中1①②③ (注14)	中2～高1相当 (注15)
	男性	9価	不活化																						中1①② (注16,17)	
		4価	不活化																						中1①②③ (注16,17)	

定期接種の推奨期間
定期接種の接種可能な期間
任意接種の推奨期間
任意接種の接種可能な期間
添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
健康保険での接種時期