【医療関係者用】日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2026年4月1日版　　日本小児科学会

ワクチン		種類	母子免疫（妊娠中）	乳児期										幼児期							学童期／思春期				
				生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上
RSウイルス	母子免疫	不活化	（注1）																					
B型肝炎	ユニバーサル	不活化				①②					③			（注2）										
	母子感染予防			①	②					③														
ロタウイルス	1価	生				①②		（注3）																
	5価					①②		③	（注4）															
肺炎球菌（PCV15、PCV20）		不活化				①②		③						④						（注5）				
５種混合（DPT-IPV-Hib）		不活化				①②		③						④			7.5歳まで			15歳未満まで使用可能				
３種混合（DPT）		不活化	（注6）																（①（注7）			（②11-12歳（注8）		
２種混合（DT）		不活化																				①11歳	12歳	
ポリオ（IPV）		不活化																	（①（注9）					
インフルエンザ菌ｂ型（ヒブ） ※アクトヒブ®で初回接種する場合		不活化				①②		③						④						（注10）				
BCG		生							①															
麻疹・風疹混合（MR）		生												（①（注11）					（②（注11, 12）					
水痘		生												①		②				（注13）				
おたふくかぜ		生												①					（②（注14）					
日本脳炎		不活化								生後6か月から接種可能								（①②）	③	7.5歳まで		④ 9-12歳		
不活化インフルエンザ		不活化								生後6か月から接種可能										毎年（10、11月などに）①②				13歳以上①
経鼻弱毒生インフルエンザ		生															2歳以上～19歳未満に			毎年（10月、11月などに）① 点鼻				
新型コロナ		mRNA								製剤により使用できる年齢が異なる														
		不活化																						
ヒトパピローマウイルス（HPV）	女性	9価（注15）	不活化																			小6	中1①②	中2～高1相当（注16）
	男性	9価	不活化																				中1①②（注17,18）	
ワクチン		種類	母子免疫（妊娠中）	生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上

定期接種の推奨期間　定期接種の接種可能な期間　任意接種の推奨期間　任意接種の接種可能な期間　添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間　健康保険での接種時期